

# آموکسی سیلین

## راهنمایهای علمی دارو جهت بیمار:

این دارو برای درمان بیماری فعلی شما تجویز شده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه مصرف آن به دیگران خودداری نمایید.

## راهنمایهای عمومی:

قبل از مصرف این دارو مخصوصا در موارد زیر، با پزشک مشورت کنید:

- در صورت سابقه حساسیت به داروهای خانواده پنی سیلین ها و سفالوسپورین ها (مثل آموکسی سیلین، سفیکسیم، ...) و داروهای دیگر نظیر مواد غذایی، رنگ ها و مواد محافظ.
- در صورت ابتلا به بیماری های کبدی، امراض گوارشی خصوصا کولیت، دیابت، سابقه حساسیت های تنفسی و پوستی (آسم، اگزما و ...).
- حاملگی و شیردهی.
- در صورت مصرف همزمان با هر نوع داروی دیگر.
- انجام هر نوع تست آزمایشگاهی.

## هشدارها:

- این دارو را با فواصل زمانی منظم (همراه با غذا یا با معده خالی) میل کنید و دوره درمان را حتی اگر ظاهرا بهبود یافته اید، کامل کنید.
- در صورت بروز اسهال بعد از مصرف این دارو، از مصرف هر گونه داروی ضد اسهال بدون مشورت با پزشک خودداری کنید.
- مصرف خودسرانه آموکسی سیلین ممکن است باعث مقاومت دارویی بدن در مقابل آنتی بیوتیک ها شود.

## مقدار و نحوه مصرف دارو:

مقدار مصرف دارو برای هر بیمار را پزشک تعیین می کند. مقادیر مصرف معمول این دارو به شرح زیر است:

بالغین و نوجوانان بیش از ۴۰ کیلوگرم وزن: بالغین و کودکان با وزن بیشتر از ۴۰ کیلوگرم: ۲۵۰ تا

۵۰۰ میلی گرم هر ۸ ساعت و یا ۵۰۰ میلی گرم تا

۸۷۵ میلی گرم هر ۱۲ ساعت.

کودکان ۳ ماه و یا بزرگتر، با وزن کمتر از ۴۰ کیلوگرم: ۶/۷ تا ۱۳/۳ میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن

هر ۸ ساعت و یا ۱۲/۵ تا ۲۲/۵ میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن هر ۱۲ ساعت.

نوزادان کمتر از ۳ ماه: ۱۵ میلی گرم و یا کمتر به ازای هر کیلوگرم وزن بدن

هر ۱۲ ساعت.

## روش تهیه سوسپانسیون:

ابتدا چند بار شیشه را تکان دهید تا پودر داخل آن از هم باز شود. سپس تا خط نشانه آب جوشیده و سرد شده را در دو مرحله به پودر بیفزایید و هر بار شیشه را خوب تکان دهید. قبل از هر بار مصرف، شیشه را

خوب تکان دهید و درپوش شیشه را محکم ببندید. برای مصرف سوسپانسیون، حتی المقدور از پیمانه داخل جعبه استفاده نمایید.

### مصرف داروی فراموش شده:

در صورت فراموش کردن یک نوبت از دارو، به محض به یاد آوردن، مقدار فراموش شده را میل نمایید. چنانچه اگر تقریباً زمان نوبت بعدی فرا رسیده بود از خوردن آن صرف نظر کرده مطابق قبل، دارو را مصرف کنید و مقدار آن را دو برابر نکنید.

### عوارض جانبی:

هر دارو به موازات اثرات مطلوب درمانی، ممکن است باعث بروز عوارض ناخواسته گردد. اگرچه کلیه این عوارض در یک فرد دیده نمی شود و یا عوارض جزئی با ادامه درمان و تطبیق بدن با دارو رفع می گردد، با این وجود در صورت بروز هر یک از عوارض زیر با پزشک مشورت کنید:

اسهال، تهوع و استفراغ، سردرد، تلخی دهان و زبان، آفت و یا زخم در دهان و زبان، خارش و ترشح واژینال، کهیر و خارش، تنگی نفس.

### شرایط نگهداری:

- دارو را دور از دسترس کودکان قرار دهید.
- قرص، کپسول و پودر جهت تهیه سوسپانسیون آموکسی سیلین را در دمای پایین تر از ۳۰ درجه سانتی گراد و دور از نور مستقیم و رطوبت نگهداری کنید.
- سوسپانسیون تهیه شده را در یخچال نگهداری و از یخ زدگی محافظت نمایید. باقیمانده سوسپانسیون را بعد از ۷ روز دور بریزید.
- از مصرف داروی تاریخ گذشته خودداری نمایید.

### بسته بندی و اشکال دارویی:

- کپسول آموکسی سیلین ۲۵۰ میلی گرمی در جعبه های ۱۲۰ عددی، هر کپسول حاوی ۲۵۰ میلی گرم آموکسی سیلین (بصورت تری هیدرات) می باشد.
- کپسول آموکسی سیلین ۵۰۰ میلی گرمی در جعبه های ۱۰۰ عددی، هر کپسول حاوی ۵۰۰ میلی گرم آموکسی سیلین (بصورت تری هیدرات) می باشد.
- قرص ایراموکس (آموکسی سیلین) ۵۰۰ میلی گرمی در جعبه های ۳۰ عددی، هر قرص حاوی ۵۰۰ میلی گرم آموکسی سیلین (بصورت تری هیدرات) می باشد.
- پودر برای تهیه ۱۰۰ میلی لیتر سوسپانسیون خوراکی آموکسی سیلین ۱۲۵، هر ۵ میلی لیتر سوسپانسیون آماده شده حاوی ۱۲۵ میلی گرم آموکسی سیلین (بصورت تری هیدرات) می باشد.
- پودر برای تهیه ۱۰۰ میلی لیتر سوسپانسیون خوراکی آموکسی سیلین ۲۵۰، هر ۵ میلی لیتر سوسپانسیون آماده شده حاوی ۲۵۰ میلی گرم آموکسی سیلین (بصورت تری هیدرات) می باشد.