

پنی سیلین وی

راهنمایهای علمی دارو جهت بیمار:

این دارو برای درمان بیماری فعلی شما تجویز شده است؛ لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه مصرف آن به دیگران خودداری نمایید.

راهنمایهای عمومی:

قبل از مصرف این دارو مخصوصا در موارد زیر، با پزشک مشورت کنید:

- در صورت داشتن حساسیت به داروهای گروه پنی‌سیلین‌ها و سفالوسپورین‌ها (مثل آموکسی‌سیلین، سفیکسیم، ...) و داروهای دیگر و یا حساسیت به مواد غذایی، رنگ‌ها و محافظ‌ها.
- سابقه آلرژی عمومی مانند آسم، اگزما، تب یونجه، کهیر، اختلال در کار کلیه‌ها...
- حاملگی و شیردهی.
- در صورت مصرف همزمان با هر نوع داروی دیگر.

هشدارها:

- در صورت عدم بهبود بیماری و یا بدتر شدن بیماری بعد از گذشت چند روز از مصرف دارو، با پزشک خود مشورت کنید.
- برای مشاهده اثر درمانی بهتر، دارو را با فواصل زمانی منظم (همراه با غذا یا با معده خالی) میل کنید و دوره درمان را حتی اگر ظاهرا بهبودی حاصل شده باشد، کامل کنید.
- قرص پنی‌سیلین وی را می‌توان با نوشیدنیهای دیگر مانند شیر یا آب میوه میل نمود.
- پنی‌سیلین‌ها، در صورت داشتن سابقه بیماری گوارشی، بخصوص کولیت اولسراتیو و کولیت ناشی از مصرف آنتی‌بیوتیک باید با احتیاط فراوان تجویز شوند.
- پنی‌سیلین‌ها به مقدار بسیار ناچیزی وارد شیر مادر می‌شوند، بنابراین ممکن است واکنشهای حساسیتی مانند اسهال، عفونتهای قارچی و حساسیت پوستی در بچه شما دیده شود.

مقدار و نحوه مصرف دارو:

مقدار مصرف دارو برای هر بیمار را پزشک تعیین می‌کند. مقادیر مصرف معمول این دارو به شرح زیر است:

بزرگسالان و کودکان بالای ۱۲ سال: ۱۲۵ تا ۵۰۰ میلی‌گرم هر ۶ تا ۸ ساعت.

کودکان با سن کمتر از ۱۲ سال: ۲/۵ تا ۱۶/۷ میلی‌گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن

هر ۴ تا ۸ ساعت.

مصرف داروی فراموش شده:

در صورت فراموش کردن یک نوبت از دارو، به محض به یاد آوردن، مقدار فراموش شده را میل نمایید. چنانچه زمان نوبت بعدی فرا رسیده بود از خوردن آن صرف نظر کرده، مطابق قبل دارو را مصرف کنید و از دو برابر کردن مقدار دارو خودداری نمایید.

عوارض جانبی:

هر دارو به موازات اثرات مطلوب درمانی، ممکن است باعث بروز عوارض ناخواسته گردد. اگرچه کلیه این عوارض در یک فرد دیده نمی‌شود و یا عوارض جزئی با ادامه درمان و تطبیق بدن با دارو رفع می‌گردد، با این وجود در صورت بروز هر یک از عوارض زیر با پزشک مشورت کنید: اسهال، اختلالات گوارشی، عوارض پوستی و حساسیتی.

شرایط نگهداری:

- دارو را دور از دسترس کودکان قرار دهید.
- قرص پنی‌سیلین وی را دور از نور مستقیم، رطوبت و دمای زیر ۳۰ درجه سانتی‌گراد نگهداری نمایید.
- از مصرف داروی تاریخ گذشته خودداری نمایید.

بسته بندی و اشکال دارویی:

- قرص روکش دار خط دار پنی‌سیلین وی ۵۰۰ در جعبه های ۱۰۰ عددی، هر قرص حاوی ۵۰۰ میلی‌گرم پنی‌سیلین وی.