

# پنتوپرازول

۲۰ و ۴۰ میلی گرم



این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز گردیده است. لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توفیه مصرف آن به دیگران خودداری کنید.

## راهنمایی های عمومی برای مصرف صحیح دارو

- قرص را می توانید قبل و یا همراه غذا و ترجیحاً صبح ها مصرف نمایید.
- قرص را بصورت کامل به همراه یک لیوان آب ولرم و از خورد کردن، شکستن و یا جویدن آن خودداری نمایید.
- امکان دارد شروع اثر دارو مدتی طول بکشد، جهت کاهش درد معده در این مدت می توان با تشخیص پزشک از ضد اسید ها استفاده کرد.
- مصرف دارو را می بایست تا کامل شدن دوره درمان ادامه دهید.
- در صورت فراموش نمودن مصرف یک نوبت از دارو، به محض یادآوری آن را مصرف کنید و از دو برابر نمودن نوبت بعدی جدا خودداری نمایید.

## قبل از مصرف این دارو در موارد زیر با پزشک خود مشورت نمایید:

- وجود هر گونه حساسیت به پنتوپرازول یا موارد دیگر از قبیل غذاها، رنگها و مواد محافظ.
- در صورت حاملگی و شیردهی.
- قبل از مصرف هر نوع دارو جدید (چه با نسخه و چه بدون نسخه).
- مصرف داروهای دیگر به ویژه وارفارین.
- سابقه یا ابتلا به بیماری های کبدی و در صورت ابتلا به کمبود روی یا مستعد بودن نسبت به آن.

## مسمومیت

- در صورت مصرف اتفاقی بیش از مقادیر توصیه شده توسط پزشک بیمار را سریعاً به بیمارستان منتقل نمایید.
- علائم مسمومیت و مصرف بیش از حد این دارو ممکن است بصورت:  
درد شکمی، تاری دید، افزایش و نامنظم بودن ضربان قلب، سرگیجه، احساس حرارت و برافروختگی، قرمزی پوست، سردرد، حالت تهوع و استفراغ باشد.

## مقدار و نحوه مصرف دارو

مقدار و نحوه مصرف هر دارو را پزشک تعیین می کند ولی میزان مصرف معمول این دارو به شرح زیر است:  
**بزرگسالان:**

- پیشگیری از بیماری رفلاکس ( بازگشت اسید معده به داخل مری):  
۲۰ میلی گرم یک بار در روز به هنگام صبح مصرف گردد. در صورت عود بیماری، این مقدار می تواند به میزان ۴۰ میلی گرم، یک بار در روز افزایش داده شود.

## • درمان بیماری رفلاکس:

- ۴۰ میلی گرم یک بار در روز (ترجیحاً صبح ها) به مدت ۸ هفته  
امکان دارد پزشک ادامه مصرف دارو را در صورت عدم بهبود به مدت ۸ هفته دیگر تجویز کند.
- درمان زخم معده:  
۴۰ میلی گرم یک بار در روز (ترجیحاً صبح ها) به مدت ۴ هفته  
امکان دارد پزشک ادامه مصرف دارو را در صورت عدم بهبود به مدت ۴ هفته دیگر تجویز کند.
- درمان زخم دوازدهه:  
۴۰ میلی گرم یک بار در روز (ترجیحاً صبح ها) به مدت ۲ هفته

## افراد مسن و بالاتر از ۶۵ سال:

مقدار مصرف در این افراد مشابه بزرگسالان می باشد.

## کودکان:

مقدار و نحوه مصرف توسط پزشک تعیین می شود.

## زنان حامله و شیرده:

مصرف این دارو در دوران بارداری و شیردهی با احتیاطی منحصراً با نظر پزشک متخصص باشد.

## تداخلات دارویی

در صورت تجویز همزمان این دارو با داروی مزالازین، دیگوکسین، ایتراکونازول و کتوکونازول با دکتر داروساز خود مشورت کنید.

## عوارض جانبی دارو

هر دارو به موازات اثرات مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز برخی عوارض ناخواسته نیز شود. اگرچه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی شود ولی در صورت بروز هر یک از علائم ذیل با پزشک مشورت نمایید

سردرد، ناراحتی های گوارشی نظیر درد در قسمت فوقانی شکم، اسهال، یبوست، واکنش های آلرژیک مانند خارش و راشهای جلدی

## شرایط نگهداری دارو

دارو را دور از نور و رطوبت در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد و درون جعبه نگهداری نمایید.  
دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید.

## پسته بندی

قرص های پنتوپرازول ۲۰ و ۴۰ میلی گرم بصورت ۳ بلیستر ۱۰ عددی داخل جعبه به همراه بروشور، توسط شرکت داروسازی کوثر تهیه و عرضه می گردد.