

رزوواستاتین

۵، ۱۰، ۲۰ و ۴۰ میلی گرم



COSAR
Pharmaceutical Co.

مقدار مصرف این دارو را پزشک تعیین می کند. دارو را هر روز در یک ساعت معین مصرف کرده و رژیم غذایی توصیه شده توسط پزشک را به دقت رعایت کنید. از مصرف آنتی اسیدهای حاوی آلومینیوم و منیزیم هیدروکساید تا دو ساعت بعد از مصرف رزوواستاتین خودداری نمایید.

دوز فراموش شده: به محض به خاطر آوردن، آنرا مصرف نمایید. در صورتی که زمان مصرف دوز بعدی تقریباً فرا رسیده است، دوز فراموش شده را رها کرده و به رژیم قبلی برگردید. هرگز دوز دارو را دو برابر نکنید.

عوارض جانبی دارو

هر دارو به موازات اثرات درمانی مطلوب، ممکن است باعث بروز برخی عوارض ناخواسته نیز گردد، اگر چه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی شوند ولی در صورت بروز هر یک با پزشک خود مشورت نمایید.

گرفتگی یا درد عضلانی، درد شدید شکمی، خستگی یا ضعف غیر معمول، رابدومیولیز (وجود میوگلوبین در ادرار)، اختلالات کارکرد کبدی و بالا رفتن میزان آنزیم های کبدی. **عوارضی که تنها در صورت ادامه یافتن با ایجاد مزاحمت نیاز به توجه پزشکی دارند:** سردرد، گلودرد، دردهای شکمی، اضطراب، درد مفاصل، ضعف، کمردرد، درد قفسه سینه، برونشیت، اسهال، سرگیجه و سوء هاضمه، نفخ، ادم، التهاب معده و روده، بیخوابی، درد عضلانی، راش و بیثورات پوستی. مسمومیت در صورت مصرف اتفاقی و بیش از مقدار توصیه شده پزشک، بیمار را سریعاً به بیمارستان منتقل نمایید.

شرایط نگهداری دارو

- دارو را دور از نور و رطوبت در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد، درون جعبه نگهداری نمایید.
- دارو را دور از دسترس کودکان قرار دهید.
- از مصرف داروهای تاریخ گذشته خودداری کنید.

بیسته بندی

قرص های رزوواستاتین ۵، ۲۰، ۴۰ میلی گرم بصورت ۳ بلیستر ۱۰ عددی داخل جعبه به همراه بروشور، توسط شرکت داروسازی کوشر تهیه و عرضه می گردد.

راهنمایی های عمومی جهت مصرف صحیح دارو

این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه آن به دیگران خودداری کنید.

قبل از مصرف این دارو در موارد زیر با پزشک خود مشورت نمایید:

- وجود هر گونه حساسیت به رزوواستاتین یا مواد دیگر از قبیل غذاها، رنگ ها و مواد محافظ.
- در دوران حاملگی و در دوران شیردهی.
- در صورت مصرف هم زمان با هر نوع داروی دیگر، بخصوص سیکلوسپورین، جم فیبروزیل، نیاسین، سایر داروهای کاهنده چربی، سایمتیدین، کتوکونازول، اسپیرونولاکتون، ضدبارداریهای خوراکی، وارفارین و آنتی اسیدها.
- در صورت ابتلا و یا سابقه بروز هر نوع بیماری، مخصوصاً بیماری های خونی، افزایش و یا کاهش فشار خون، اختلالات کبدی از قبیل افزایش بی دلیل آنزیم های کبدی، نارسایی کلیوی، دفع پروتئین از ادرار، هر نوع بیماری عضلانی، اختلالات شدید متابولیکی و الکترولیتی، اختلال غدد درون ریز و تشنج کنترل نشده.

مصرف در حاملگی و شیردهی

در صورت بارداری بودن و یا قصد بارداری شدن و همچنین در دوران شیردهی مصرف این دارو ممنوع است.

نکات قابل توصیه

- در طول دوره درمان مراجعه منظم به پزشک جهت بررسی روند درمان ضروری است، زیرا در طول درمان کنترل میزان کلسترول برای تنظیم دوز دارو و نحوه عملکرد کبد ضروری می باشد.
- بدون مشورت با پزشک خود، مصرف دارو را قطع نکنید.
- در صورت حاملگی یا احتمال وقوع آن فوراً پزشک خود را مطلع سازید.
- قبل از انجام هرگونه جراحی یا درمان های اورژانس، موضوع را با پزشک خود مطرح نمایید.
- در صورت بروز درد و ضعف عضلانی بویژه همراه با تب بلافاصله موضوع را به پزشک اطلاع دهید.

مقدار و نحوه مصرف دارو

با توجه به این که تجویز مقدار دارو به پاسخ بالینی و غلظت سرمی حاصله بستگی دارد،