

تامسولوسین

پیوسته رهش
۴/۰ میلی گرم



دوز فراموش شده:

در صورت فراموش نمودن مصرف یک نوبت از دارو، به محض یادآوری آن را مصرف کنید و از دو برابر نمودن نوبت بعدی جداً خودداری نمایید.

عوارض جانبی

هر دارو به موازات اثر درمانی مطلوب ممکن است، باعث بروز عوارض ناخواسته نیز گردد، اگر چه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی شود ولی در صورت بروز هر یک از آنها با پزشک خود مشورت نمایید.
انزال غیر طبیعی، کمر درد، اسهال، سرگیجه، سردرد، گرفتگی بینی، آبریزش بینی، ضعف غیر عادی، درد قفسه سینه، کاهش میل جنسی، اختلال در خواب، غش یا سبکی سر بخصوص در هنگام برخاستن، خواب آلودگی، حالت تهوع

مسمومیت

در صورت مصرف اتفاقی و بیش از مقدار توصیه شده پزشک، بیمار را سریعاً به بیمارستان منتقل کنید.

شرایط نگهداری

دارو را دور از نور و رطوبت در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد، نگهداری کنید.
دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید.

بسته بندی

کپسول های تامسولوسین ۰/۴ میلی گرمی به صورت ۳ بلیستر ۱۰ عددی و به همراه یک برگ راهنما درون جعبه مقوایی توسط شرکت داروسازی کوثر بسته بندی و عرضه می گردد.

این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه آن به دیگران خودداری کنید.

قبل از مصرف این دارو در موارد زیر با پزشک خود مشورت نمایید:

- وجود هر گونه حساسیت به تامسولوسین و مواد دیگر از قبیل غذاها، رنگها و مواد محافظ.
- در صورت مصرف هم زمان با هر نوع داروی دیگر از قبیل دوکسازوسین، فنتولامین، پرازوسین، ترازوسین، وارفارین.
- در صورت ابتلا و یا سابقه هر نوع بیماری از قبیل احساس سرگیجه و سبکی سر و یا غش هنگام برخاستن.

مصرف در بارداری و شیردهی

مصرف این دارو در زنان کاربردی ندارد.

نکات قابل توجه

- کپسول را به طور کامل بلعیده و از باز کردن، جویدن و یا خرد کردن محتویات خودداری نمایید.
- مصرف این دارو ممکن است سبب خواب آلودگی شود، لذا ضمن درمان از رانندگی و کار با وسایلی که نیاز به هوشیاری کامل دارند خودداری نمایید.
- قبل از مصرف به برگه راهنمای داخل جعبه مراجعه نمایید.
- فروش بدون نسخه پزشک ممنوع است.

مقدار و نحوه مصرف دارو

مقدار و نحوه مصرف هر دارو را پزشک تعیین می کند اما میزان مصرف معمول این دارو به شرح زیر است:

در درمان هیپرپلازی خوش خیم پروستات (بزرگ شدن پروستات):

بزرگسالان: در ابتدا ۰/۴ میلی گرم و بصورت یکبار در روز، نیم ساعت بعد از هر وعده غذایی که در صورت تشخیص پزشک، میزان دوز افزایش می یابد.