

آمپی سیلین

راهنمایهای علمی دارو جهت بیمار:

این دارو برای درمان بیماری فعلی شما تجویز شده است؛ لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه مصرف آن به دیگران خودداری نمایید.

راهنمایهای عمومی:

قبل از مصرف این دارو مخصوصا در موارد زیر، با پزشک مشورت کنید:

- در صورت داشتن حساسیت به داروهای گروه پنی سیلین ها و سفالوسپورین ها (مثل آموکسی سیلین، سفیکسیم و ...) و داروهای دیگر و یا حساسیت به مواد غذایی، رنگ ها و محافظ ها.
- در صورت ابتلا به بیماریهای کلیوی، بیماریهای گوارشی، دیابت، اگزما و آسم.
- حاملگی و شیردهی.
- در صورت مصرف همزمان با هر نوع داروی دیگر.
- انجام هر نوع تست آزمایشگاهی.

هشدارها:

- برای مشاهده اثر درمانی بهتر، دارو را با فواصل زمانی منظم و با معده خالی (۳۰ دقیقه قبل از غذا و یا ۲ ساعت بعد از غذا) میل کنید و دوره درمان را حتی اگر ظاهرا بهبودی حاصل شده باشد، کامل کنید.
- در صورت بروز اسهال بعد از مصرف این دارو، از مصرف هر گونه داروی ضد اسهال بدون مشورت با پزشک خودداری کنید.

مقدار و نحوه مصرف دارو:

مقدار مصرف دارو برای هر بیمار را پزشک تعیین می کند. مقادیر مصرف معمول این دارو به شرح زیر است:

بالغین و کودکان با وزن بیش از ۲۰ کیلوگرم: ۲۵۰ تا ۵۰۰ میلی گرم هر ۶ ساعت یکبار.

اطفال با وزن کمتر از ۲۰ کیلوگرم: ۱۲/۵ تا ۲۵ میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن

هر ۶ ساعت یکبار و یا ۱۶/۷ تا ۳۳/۳ میلی گرم برای

هر کیلوگرم وزن بدن هر ۸ ساعت یکبار.

روش تهیه سوسپانسیون:

ابتدا چند بار شیشه را تکان دهید تا پودر داخل آن از هم باز شود. سپس تا خط نشانه آب جوشیده و سرد شده را در دو مرحله به پودر بیفزایید و هر بار شیشه را خوب تکان دهید. قبل از هر بار مصرف، شیشه را خوب تکان دهید و درپوش شیشه را بعد از مصرف محکم ببندید. برای مصرف سوسپانسیون، حتی المقدور از پیمانه داخل جعبه استفاده نمایید و یا از قاشقی استفاده کنید که مقدار لازم را (۵ میلی لیتر) به بیمار برساند.

مصرف داروی فراموش شده:

در صورت فراموش کردن یک نوبت از دارو، به محض به یاد آوردن، مقدار فراموش شده را میل نمایید. چنانچه زمان نوبت بعدی فرا رسیده بود از خوردن آن صرف نظر کرده، مطابق قبل دارو را مصرف کنید و از دو برابر کردن مقدار دارو خودداری نمایید.

عوارض جانبی:

هر دارو به موازات اثرات مطلوب درمانی، ممکن است باعث بروز عوارض ناخواسته گردد. اگرچه کلیه این عوارض در یک فرد دیده نمی شود و یا عوارض جزئی با ادامه درمان و تطبیق بدن با دارو رفع می گردد، با این وجود در صورت بروز هر یک از عوارض زیر با پزشک مشورت کنید:

مشکلات معده ای و روده ای، شوک آنافیلاکتیک، کهیر، اسهال، تهوع، استفراغ، تنگی نفس، ضعف عضلانی، کولیت، ورم مخاط دهان و لثه، التهابات پوستی.

شرایط نگهداری:

- دارو را دور از دسترس کودکان قرار دهید.
- کپسول و پودر جهت تهیه سوسپانسیون آمپی سیلین را در دمای پایین تر از ۳۰ درجه سانتی گراد (ترجیحاً بین ۱۵ تا ۳۰ درجه سانتی گراد) و ، دور از نور مستقیم و رطوبت نگهدارید.
- سوسپانسیون تهیه شده را در یخچال نگهداری و از یخ زدگی محافظت نمایید. باقیمانده سوسپانسیون را بعد از ۷ روز دور بریزید.
- از مصرف داروی تاریخ گذشته خودداری نمایید.

بسته بندی و اشکال دارویی:

- کپسول آمپی سیلین ۲۵۰ میلی گرمی در جعبه های ۱۲۰ عددی، هر کپسول حاوی ۲۵۰ میلی گرم آمپی سیلین (بصورت تری هیدرات) می باشد.
- کپسول آمپی سیلین ۵۰۰ میلی گرمی در جعبه های ۱۰۰ عددی، هر کپسول حاوی ۵۰۰ میلی گرم آمپی سیلین (بصورت تری هیدرات) می باشد.
- پودر برای تهیه ۱۰۰ میلی لیتر سوسپانسیون خوراکی آمپی سیلین ۱۲۵، هر ۵ میلی لیتر سوسپانسیون آماده شده حاوی ۱۲۵ میلی گرم آمپی سیلین (بصورت تری هیدرات) می باشد.
- پودر برای تهیه ۱۰۰ میلی لیتر سوسپانسیون خوراکی آمپی سیلین ۲۵۰، هر ۵ میلی لیتر سوسپانسیون آماده شده حاوی ۲۵۰ میلی گرم آمپی سیلین (بصورت تری هیدرات) می باشد.