

سفیکسیم

راهنمایهای علمی دارو جهت بیمار:

این دارو برای درمان بیماری فعلی شما تجویز شده است؛ لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه مصرف آن به دیگران خودداری نمایید.

راهنمایهای عمومی:

قبل از مصرف این دارو مخصوصا در موارد زیر، با پزشک مشورت کنید:

- در صورت داشتن حساسیت به داروهای گروه پنی‌سیلین‌ها و سفالوسپورین‌ها (مثل آموکسی‌سیلین، سفالکسین، ...) و داروهای دیگر و یا حساسیت به مواد غذایی، رنگ‌ها و محافظ‌ها.
- در صورت ابتلا به بیماری‌های کلیوی و کبدی، بیماری‌های گوارشی خصوصا کولیت و یا مشکلات خونی.
- حاملگی و شیردهی.
- در صورت مصرف همزمان با هر نوع داروی دیگر.
- انجام هر نوع تست آزمایشگاهی.

هشدارها:

- برای مشاهده اثر درمانی بهتر، دارو را با فواصل زمانی منظم (همراه با غذا یا با معده خالی) میل کنید و دوره درمان را حتی اگر ظاهرا بهبودی حاصل شده باشد، کامل کنید.
- در صورت بروز اسهال بعد از مصرف این دارو، از مصرف هر گونه داروی ضد اسهال بدون مشورت با پزشک خودداری کنید.
- در صورت بروز هر نوع حساسیت به سفیکسیم مصرف دارو را قطع نموده و به پزشک خود مراجعه نمایید.
- مصرف خودسرانه سفیکسیم ممکن است باعث مقاومت دارویی بدن در مقابل آنتی بیوتیک‌ها شود.

مقدار و نحوه مصرف دارو:

مقدار مصرف دارو برای هر بیمار را پزشک تعیین می‌کند. مقادیر مصرف معمول این دارو به شرح زیر است:

بالغین و کودکان با وزن بیش از ۵۰ کیلوگرم: ۲۰۰ میلی‌گرم هر ۱۲ ساعت و یا ۴۰۰ میلی‌گرم

یک بار در روز.

کودکان ۶ ماه تا ۱۲ سال با وزن کمتر از ۵۰ کیلوگرم: ۴ میلی‌گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن هر ۱۲ ساعت و یا ۸ میلی‌گرم به ازای هر کیلوگرم

وزن بدن یک بار در روز.

نوزادان با سن کمتر از ۶ ماه: مقدار مصرفی دارو توسط پزشک معالج تعیین

می‌گردد.

روش تهیه سوسپانسیون در شیشه ۵۰ و ۱۰۰ میلی لیتری:

ابتدا چند بار شیشه را تکان دهید تا پودر داخل آن از هم باز شود. سپس تا خط نشانه آب جوشیده و سرد شده را در دو مرحله به پودر بیفزایید و هر بار شیشه را خوب تکان دهید. قبل از هر بار مصرف، شیشه را خوب تکان دهید و درپوش شیشه را بعد از مصرف محکم ببندید. برای مصرف سوسپانسیون، حتی‌المقدور از پیمانه داخل جعبه استفاده نمایید و یا از قاشقی استفاده کنید که مقدار لازم را (۵ میلی لیتر) به بیمار برساند.

مصرف داروی فراموش شده:

در صورت فراموش کردن یک نوبت از دارو، به محض به یاد آوردن، مقدار فراموش شده را میل نمایید. چنانچه زمان نوبت بعدی فرا رسیده بود از خوردن آن صرف نظر کرده مطابق قبل، دارو را مصرف کنید و از دو برابر کردن مقدار دارو خودداری نمایید.

عوارض جانبی:

هر دارو به موازات اثرات مطلوب درمانی، ممکن است باعث بروز عوارض ناخواسته گردد. اگرچه کلیه این عوارض در یک فرد دیده نمی شود و یا عوارض جزئی با ادامه درمان و تطبیق بدن با دارو رفع می گردد، با این وجود در صورت بروز هر یک از عوارض زیر با پزشک مشورت کنید: اسهال، تهوع، استفراغ، سوء هاضمه، تنگی نفس، کهیر، سردرد، سرگیجه، تب، آفت و یا زخم در دهان و زبان

شرایط نگهداری:

- دارو را دور از دسترس کودکان قرار دهید.
- قرص، کپسول و پودر جهت تهیه سوسپانسیون سفیکسیم را در دمای پایین تر از ۳۰ درجه سانتی گراد و دور از نور مستقیم و رطوبت نگهداری کنید.
- سوسپانسیون تهیه شده را در یخچال نگهداری و از یخ زدگی محافظت نمایید. باقیمانده سوسپانسیون را بعد از ۱۴ روز دور بریزید.
- از مصرف داروی تاریخ گذشته خودداری نمایید.

بسته بندی و اشکال دارویی:

- قرص سفیکسیم ۲۰۰ و ۴۰۰ میلی گرمی در جعبه های ۱۰ عددی، هر قرص به ترتیب حاوی ۲۰۰ و ۴۰۰ میلی گرم سفیکسیم (بصورت تری هیدرات) می باشد.
- پودر برای تهیه ۵۰ و ۱۰۰ میلی لیتر سوسپانسیون خوراکی سفیکسیم ۱۰۰، هر ۵ میلی لیتر سوسپانسیون آماده شده حاوی ۱۰۰ میلی گرم سفیکسیم (بصورت تری هیدرات) می باشد.
- کپسول سفیکسیم ۲۰۰ و ۴۰۰ میلی گرمی در جعبه های ۱۰ عددی، هر کپسول به ترتیب حاوی ۲۰۰ و ۴۰۰ میلی گرم سفیکسیم (بصورت تری هیدرات) می باشد.